

ZALECENIA ORGANIZACYJNE DLA CENTRUM REHABILITACJI GRAWITACJA
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Z ZAKRESU FIZJOTERAPII, W TYM PRAKTYK
ZAWODOWYCH W OKRESIE PANDEMII W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
WIRUSA SARS-COV-2

 **Każda osoba przebywająca w Centrum Grawitacja:**

- przybywa na wizytę zgodnie z harmonogramem o wyznaczonej godzinie,
- zakrywa usta i nos,
- mierzy temperaturę, temperatura powyżej 37,4°C wyklucza możliwość odbycia wizyty,
- dezynfekuje ręce po wejściu do placówki oraz po fizycznym kontakcie z innymi osobami - dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie,
- każdy Pacjent (w przypadku Pacjenta nieletniego jego opiekun prawny lub osoba upoważniona) zobligowany jest do wypełnienia „Ankiety Wstępnej Kwalifikacji” lub „Ankiety Aktualizacyjnej” związanych z Covid-19,
- w pomieszczeniach wspólnych typu: recepcja, szatnia, sala dla rodziców, wskazane jest zachowanie dystansu społecznego 2 metry

 **Fizjoterapeuta / lekarz / terapeuta:**

- dezynfekuje po terapii powierzchnie robocze, przybory wykorzystywane w trakcie fizjoterapii/terapii/konsultacji oraz wszelkie elementy wyposażenia gabinetu (biurko, krzesło, klamki, itp.)
- dezynfekuje / myje ręce zgodnie z obowiązującymi standardami,
- zachowuje dystans minimum 1,5 metra z innymi osobami w pomieszczeniu socjalnym / szatni,
- zakrywa stale nos i usta, a maskę lub przyłbicę zdejmuje tylko w czasie posiłków i w odosobnieniu,
- stosuje rekomendacje i wytyczne Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia na czas epidemii (min. w trakcie fizjoterapii/terapii/konsultacji pracujemy w maskach i przyłbicach),
- w trakcie terapii/konsultacji indywidualnej, fizjoterapeuta/lekarz/terapeuta pracujący w najbliższym kontakcie fizycznym był zabezpieczony minimum w maskę ffp2 lub maskę chirurgiczną i przyłbicę,

- odpowiednio często wietrzymy wszystkie możliwe pomieszczenia, a także, pomiędzy sesjami, gabinety i sale, w których odbywa się terapia/konsultacja,
- pacjenci na sali terapeutycznej SI/ sali fizjoterapii powinni być rozmieszczeni od siebie w odległości minimum 2,5 metra,

Wytyczne opracowane na podstawie wytycznych: konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, GIS i MZ.